

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (priložena PP/ALU folija in navodila za uporabo)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke
fipronil

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Učinkovina:
fipronil.....50,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 0,50 ml
2 x 0,50 ml
3 x 0,50 ml
4 x 0,50 ml
6 x 0,50 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami (*Ctenocephalides felis*) pri mačkah. Trajanje zaščite pred infestacijami z bolhami je 5 tednov.

Zdravljenje infestacije s klopi (*Ixodes ricinus*). Klopi (*Ixodes ricinus*) na živali bodo poginili v 48 urah. Zdravljenje ne ščiti pred novimi infestacijami s klopi.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kako uporabljati Fiprotec:



Način uporabe – topikalni nanos na kožo.

Odmerjanje: Ena 0,5 ml merilna kapalka na mačko.

Samo za zunanjo uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Uporabite takoj po prvem odpiranju pretisnega omota.

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Merilno kapalko do uporabe shranjujte v pretisnem omotu in škatli, da jo zaščitite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na škatli po EXP. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Zdravilo ima lahko neželen učinek na vodne organizme. Da preprečite kontaminacijo, zdravila ali praznih vsebnikov ne odlagajte v ribnike, vodotoke ali jarke.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI« IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Beaphar SAS
2 Allée Vivaldi
Le San Giorgio
06800 Cagnes Sur Mer
Francija
T: +33 (0)4 93 19 05 20

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0601/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (priložena folija Barex®, brez navodil za uporabo)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke
fipronil

2. NAVEDBA UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN

Ena 0,5 ml merilna kapalka vsebuje:

Učinkovina:

fipronil.....50,0 mg

Pomožne snovi:

butilhidroksianizol (E320)0,100 mg

butilhidroksitoluen (E321)0,050 mg

benzilalkohol (E1519).....142,500 mg

Bistra brezbarvna do rahlo rumena raztopina.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 0,50 ml

2 x 0,50 ml

3 x 0,50 ml

6 x 0,50 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami (*Ctenocephalides felis*) pri mačkah. Trajanje zaščite pred infestacijo z bolhami je 5 tednov.

Zdravljenje infestacije s klopi (*Ixodes ricinus*). Klopi (*Ixodes ricinus*) na živali bodo poginili v 48 urah. Zdravljenje ne ščiti pred novimi infestacijami s klopi.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE



Način uporabe – topikalni nanos na kožo.

Odmerjanje: Ena 0,5 ml merilna kapalka na mačko.

Samo za zunanjo uporabo.

Merilne kapalka do uporabe shranjujte v originalni ovojnini.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred vsako uporabo preberite celotna navodila in vsa opozorila v notranjosti škatlice, vključno z opozorili za uporabnika.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Uporabite takoj po prvem odpiranju.

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Merilne kapalka do uporabe shranjujte v škatli, da jih zaščitite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na škatli po EXP. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

Zdravilo ima lahko neželen učinek na vodne organizme. Da preprečite kontaminacijo, zdravila ali praznih vsebnikov ne odlagajte v ribnike, vodotoke ali jarke.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Beaphar SAS
2 Allée Vivaldi
Le San Giorgio
06800 Cagnes Sur Mer
Francija
T: +33 (0)4 93 19 05 20

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0601/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Kartonska škatla (priložena folija Barex®, brez navodil za uporabo)

1. KONTRAINDIKACIJE

Ker ni razpoložljivih podatkov, se zdravilo ne sme uporabljati na mačjih mladičih, starih manj kot 8 tednov in/ali mačkah, ki tehtajo manj kot 1 kg.

Ne uporabite pri bolnih živalih ali živalih, ki okrevajo po bolezni.

Ne uporabljajte pri kuncih, saj lahko to privede do neželenih učinkov in celo smrti.

Ne uporabljajte v primerih preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

2. NEŽELENI UČINKI

Pri lizanju se lahko zaradi lastnosti nosilca učinkovine pojavi kratkotrajno čezmerno slinjenje.

Med izjemno redkimi domnevnimi neželenimi učinki so po uporabi poročali o začasni kožni reakciji na mestu uporabe (razbarvanje kože, lokalno izpadanje dlake, srbečica, eritem) in splošni srbečici ali izpadanju dlake. Izjemoma so po uporabi opazili čezmerno slinjenje, reverzibilne nevrološke simptome (čezmerna občutljivost kože, depresija, živčni znaki), bruhanje ali znake oteženega dihanja.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

3. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Merilno kapalko držite navpično. Potapkejte po ozkem delu merilne kapanke, da vsebina zdrsnje v glavni del kapanke. S škarjami odrežite vrh merilne kapanke. Razmaknite dlako na hrbtu med lopaticama tako, da je koža vidna. Konico merilne kapanke nastavite na kožo in nežno iztisnite vsebino iz merilne kapanke na kožo, po možnosti na dveh mestih: prvo na stiku vratu in dna glave in drugo 2 do 3 cm nižje po vratu.

Pazite, da z zdravilom preveč ne zmočite dlake na mestu nanosa, saj to povzroči zlepljen videz na mestu zdravljenja. Če se to zgodi, tak videz izgine v 24 urah po nanosu.

Ker študije o varnosti niso bile izvedene, ne nanašajte zdravila pogosteje kot vsake štiri tedne.

4. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Za doseganje optimalnega obvladovanja težav z bolhami v gospodinjstvih, kjer sočasno prebiva več domačih ljubljencev, je treba z ustreznim insekticidom hkrati zdraviti vse pse in mačke. Bolhe se pogosto zaredijo v košarah domačih ljubljencev, v posteljnini in na vseh mestih, kjer žival pogosto počiva, npr. v preprogah in mehkih pohištvi. V primeru hude infestacije je treba tudi ta mesta ustrezno obravnavati in ob uvedbi kontrolnih ukrepov uporabiti ustrezen insekticid ter jih redno sesati.

Izogibajte se pogostemu kopanju ali šamponiranju živali, ker vzdrževanje učinkovitosti zdravila v teh primerih ni bilo preizkušeno.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Samo za zunanjo uporabo. Preprečite stik zdravila z očmi živali. Če pride do nenamerne stika zdravila z očmi, jih takoj in temeljito spirajte z vodo.

Pred nanosom zdravila je treba žival natančno stehtati.

Pomembno je zagotoviti, da se zdravilo nanese na mesto, kjer ga žival ne more polizati, in da živali po nanosu ne ližejo druga druge.

Morda so na živali še vedno prisesani klopi. Zato prenosa nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo klopi, ni mogoče izključiti.

Zdravila ne nanašajte na rane ali poškodovano kožo.

Ne uporabljajte pri neciljnih živalskih vrstah, zlasti ne pri kuncih in morskih prašičkih.

Bodite posebno pozorni, če lahko mačji mladiči, mlajši od 8 tednov, pridejo v stik s tretirano mačko, ker potencialno tveganje uporabe izdelka pri mačjih mladičih ni znano.

Ne uporabite sočasno z drugimi sredstvi proti bolham, ki se nanašajo neposredno na žival.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

To zdravilo lahko povzroči nevrotoksičnost. Merilne kapalke do uporabe shranjujte v originalni embalaži. Da bi otrokom preprečili dostop do uporabljenih merilnih kapalk, jih takoj po uporabi zavržite.

Osebe z znano preobčutljivostjo na fipronil ali na katero koli pomožno snov naj se izogibajo stiku z zdravilom.

Zdravilo lahko povzroči draženje sluznic in oči. Izogibati se je potrebno stiku zdravila z usti in očmi. V primeru nenamernega stika z očmi ali draženja oči med dajanjem, je treba oči takoj temeljito sprati z vodo. Če draženje oči ne preneha, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Izogibajte se stiku zdravila s prsti. V primeru nenamernega stika s kožo, izpostavljeno mesto takoj umijte z milom in vodo.

Po uporabi si umijte roke.

Med dajanjem ne kadite, pijte ali jejte.

Zdravljenih živali se ne dotikajte, otroci pa se ne smejo igrati z njimi, dokler mesto nanosa ni suho. Priporočljivo je, da se zdravila živalim ne daje podnevi ampak zgodaj zvečer. Pred kratkim zdravljene živali ne smejo spati z lastniki, zlasti ne z otroki.

Brežost, laktacija in nesnost:

Ne uporabite pri brejih ali doječih mačkah.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi), če je potrebno:

Tveganje za pojav neželenih učinkov lahko narašča s prevelikem odmerjanjem. Po zdravljenju se lahko pojavi srbenje.

Uporaba prevelikega odmerka zdravila povzroči lepljiv videz dlačic na mestu zdravljenja. Če se to zgodi, tak videz izgine v 24 urah po nanosu.

Drugi previdnostni ukrepi:

Zdravilo ima lahko neželene učinke na pobarvane, lakirane ali druge površine in opremo v gospodinjstvu.

5. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

21.7.2022

6. DRUGE INFORMACIJE

1, 2, 3, 6 merilnih kapalk je pakiranih v kartonsko škatlo.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:

Beaphar B.V.

Oude Linderteseweg 9

8102 EV Raalte
NIZOZEMSKA
Tel.: +31 572 348 900
Faks: + 31 572 348 935
e-pošta: hqb@beaphar.com

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Pretisni omot (ALU FOLIJA)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke
fipronil



2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

fipronil.....50,0 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 x 0,50 ml
2 x 0,50 ml
3 x 0,50 ml
4 x 0,50 ml
6 x 0,50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Topikalni nanos na kožo

5. KARENCA

Ni smiselno.

6. ŠTEVILKA SERIJE


Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.



PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Kapalka (PP FOLIJA)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg fipronil



(izbirno)

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Glejte aluminijasti pretisni omot

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Glejte aluminijasti pretisni omot

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MERILNIH KAPALKAH
IN PRETISNIH OMOTIH**

(folija Barex®)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke
fipronil

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Beaphar SAS

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

{mesec/leto}

4. ŠTEVILKA SERIJE

{številka}

5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

B. NAVODILO ZA UPORABO

(Priloženo samo v primeru PP/ALU folije)

NAVODILO ZA UPORABO:

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke

**1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ,
ČE STA RAZLIČNA**

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Beaphar SAS
2 Allée Vivaldi
Le San Giorgio
06800 Cagnes Sur Mer
Francija
T: +33 (0)4 93 19 05 20
F: +33 (0)4 93 19 05 21

Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg 9
8102 EV, Raalte
Nizozemska
T : +31 572 348 834
F : +31 572 348 835
E : hqb@beaphar.com

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FIPROtec 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke
fipronil



3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

Ena 0,5 ml merilna kapalka vsebuje:

Učinkovina:

fipronil.....50,0 mg

Pomožne snovi:

butilhidroksianizol (E320)0,100 mg

butilhidroksitoluen (E321)0,050 mg

benzilalkohol (E1519).....142,500 mg

Bistra brezbarvna do rahlo rumena raztopina.

4. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami (*Ctenocephalides felis*) pri mačkah. Trajanje zaščite pred infestacijami z bolhami je 5 tednov.

Zdravljenje infestacije s klopi (*Ixodes ricinus*). Klopi (*Ixodes ricinus*) na živali bodo poginili v 48 urah. Zdravljenje ne ščiti pred novimi infestacijami s klopi.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ker ni razpoložljivih podatkov, se zdravilo ne sme uporabljati na mačjih mladičih, starih manj kot 8 tednov in/ali mačkah, ki tehtajo manj kot 1 kg.

Ne uporabite pri bolnih živalih ali živalih, ki okrevajo po bolezni.

Ne uporabljajte pri kuncih, saj lahko to privede do neželenih učinkov in celo smrti.

Ne uporabljajte v primerih preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

6. NEŽELENI UČINKI

Pri lizanju se lahko zaradi lastnosti nosilca učinkovine pojavi kratkotrajno čezmerno slinjenje. Med izjemno redkimi domnevnimi neželenimi učinki so po uporabi poročali o začasni kožni reakciji na mestu uporabe (razbarvanje kože, lokalno izpadanje dlake, srbečica, eritem) in splošni srbečici ali izpadanju dlake. Izjemoma so po uporabi opazili čezmerno slinjenje, reverzibilne nevrološke simptome (čezmerna občutljivost kože, depresija, živčni znaki), bruhanje ali znake oteženega dihanja.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke



8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Kako uporabljati Fiprotec:



Način uporabe – topikalni nanos na kožo.


Odmerjanje: Ena 0,5 ml merilna kapalka na mačko.

Samo za zunanjo uporabo.

Merilne kapalko do uporabe shranjujte v originalni ovojnini.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Uporabite vogale za lažje načevanje, da odstranite merilno kapalko iz pretisnega omota. Folije ne prebadajte s škarijami, noži ali drugimi ostrimi instrumenti, saj to lahko poškoduje merilno kapalko znotraj.



Merilno kapalko držite navpično. Potapkejte po ozkem delu merilne kapalke, da vsebina zdrsne v glavni del kapalke. S škarjami odrežite vrh merilne kapalke. Razmaknite dlako na hrbtu med lopaticama tako, da je koža vidna. Konico merilne kapalke nastavite na kožo in nežno iztisnite vsebino iz merilne kapalke na kožo, po možnosti na dveh mestih: prvo na stiku vratu in dna glave in drugo 2 do 3 cm nižje po vratu.

Pazite, da z zdravilom preveč ne zmočite dlake na mestu nanosa, saj to povzroči zlepljen videz na mestu zdravljenja. Če se to zgodi, tak videz izgine v 24 urah po nanosu.

Ker študije o varnosti niso bile izvedene, ne nanašajte zdravila pogosteje kot vsake štiri tedne.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Uporabite takoj po prvem odpiranju pretisnega omota.

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Kapalko do uporabe shranjujte v pretisnem omotu in škatli, da jo zaščitite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na škatli po EXP. Rok uporabnosti se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Za doseganje optimalnega obvladovanja težav z bolhami v gospodinjstvih, kjer sočasno prebiva več domačih ljubljencev, je treba z ustreznim insekticidom hkrati zdraviti vse pse in mačke. Bolhe se pogosto zaredijo v košarah domačih ljubljencev, v posteljnini in na vseh mestih, kjer žival pogosto počiva, npr. v preprogah in mehkem pohištvu. V primeru hudih infestacij je treba tudi ta mesta ustrezno obravnavati in ob uvedbi kontrolnih ukrepov uporabiti ustrezen insekticid ter jih redno sesati.

Izogibajte se pogostemu kopanju ali šamponiranju živali, ker vzdrževanje učinkovitosti zdravila v teh primerih ni bilo preizkušeno.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Samo za zunanjo uporabo. Preprečite stik zdravila z očmi živali. Če pride do nenamernega stika zdravila z očmi, jih takoj in temeljito spirajte z vodo.

Pred nanosom zdravila je treba žival natančno stehtati.

Pomembno je zagotoviti, da se zdravilo nanese na mesto, kjer ga žival ne more polizati, in da živali po nanosu ne ližejo druga druge.

Morda so na živali še vedno prisene klopi. Zato prenosa nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo klopi, ni mogoče izključiti.

Zdravila ne nanašajte na rane ali poškodovano kožo.

Ne uporabljajte pri neciljnih živalskih vrstah, zlasti ne pri kuncih in morskih prašičkih.

Bodite posebno pozorni, če lahko mačji mladiči, mlajši od 8 tednov, pridejo v stik s tretirano mačko, ker potencialno tveganje uporabe izdelka pri mačjih mladičih ni znano.

Ne uporabite sočasno z drugimi sredstvi proti bolham, ki se nanašajo neposredno na žival.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

To zdravilo lahko povzroči nevrotoksičnost. Merilne kapalke do uporabe shranjujte v originalni embalaži. Da bi otrokom preprečili dostop do uporabljenih merilnih kapalk, jih takoj po uporabi zavrzite.

Osebe z znano preobčutljivostjo na fipronil ali na katero koli pomožno snov naj se izogibajo stiku z zdravilom.

Zdravilo lahko povzroči draženje sluznic in oči. Izogibati se je potrebno stiku zdravila z usti in očmi. V primeru nenamernega stika z očmi ali draženja oči med dajanjem, je treba oči takoj temeljito sprati z vodo. Če draženje oči ne preneha, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Izogibajte se stiku zdravila s prsti. V primeru nenamernega stika s kožo, izpostavljeno mesto takoj umijte z milom in vodo.

Po uporabi si umijte roke.

Med dajanjem ne kadite, pijte ali jejte.

Zdravljenih živali se ne dotikajte, otroci pa se ne smejo igrati z njimi, dokler mesto nanosa ni suho. Priporočljivo je, da se zdravila živalim ne daje podnevi ampak zgodaj zvečer. Pred kratkim zdravljene živali ne smejo spati z lastniki, zlasti ne z otroki.

Brejost in laktacija:

Ne uporabite pri bregjih ali doječih mačkah.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Tveganje za pojav neželenih učinkov lahko narašča s prevelikem odmerjanjem. Po zdravljenju se lahko pojavi srbenje.

Uporaba prevelikega odmerka zdravila povzroči lepljiv videz dlačic na mestu zdravljenja. Če se to zgodi, tak videz izgine v 24 urah po nanosu.

Drugi previdnostni ukrepi:

Zdravilo ima lahko neželene učinke na pobarvane, lakirane ali druge površine in opremo v gospodinjstvu.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

Zdravilo ima lahko neželen učinek na vodne organizme. Da preprečite kontaminacijo, zdravila ali praznih vsebnikov ne odlagajte v ribnike, vodotoke ali jarke.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO

21.7.2022

15. DRUGE INFORMACIJE

1, 2, 3, 4, 6 merilnih kapalk je pakiranih v kartonsko škatlo.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.